



## **LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a fertőző megbetegedések megelőzéséhez**

A fertőző megbetegedések megelőzéséhez a lakosság helyes magatartása nagymértékben hozzájárulhat. Ennek érdekében ezúton szeretnénk felhívni az ár- és belvíz által sújtott települések lakosságának figyelmét az alábbiak betartásának kiemelt fontosságára, saját maguk és a környezetükben élők egészségének megőrzése, a veszélyek csökkentése céljából.

1.) A védekezésben részt nem vevő lakosoknak lehetőleg kerülni kell a szennyezettnek és feltételezhetően fertőzőnek minősíthető árvízzel-belvízzel való érintkezést.

2.) Szennyezett víz szájba, szembe, testfelületre jutását lehetőség szerint el kell kerülni.

3.) Árvíz-belvíz által előtött vagy szennyezett ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni, mindaddig, amíg az ár levonulása után hatékony fertőtlenítésük meg nem történik, az egészségügyi hatóság előírásai szerint.

4.) Az ár és belvízzel sújtott településeken, a vezetékes ivóvíz használható, hacsak az egészségügyi hatóság ettől eltérően nem rendelkezik. Ez utóbbi esetben az egészségügyi hatóság tájékoztatását kell figyelembe venni az ivóvíz felhasználása során.

5.) Vízvezetéseken bekövetkező csőtörést, vízkimaradást azonnal jelentsék a vízmű üzemeltetőnek és az illetékes egészségügyi hatóság járási/kerületi intézetnek, és további intézkedésig csak forralt vizet szabad használni.

6.) Az ár- és belvíz elleni védekezéssel foglalkozóknak, vagy egyéb módon a szennyezett vízzel, tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatba kerülőknek (pl. lakótér takarítás stb.) munkavégzés után, illetve étkezések előtt fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezniük.

Feltétlenül mossunk kezet

- amikor hazaérünk,
- WC használat előtt és után,
- minden esetben, ha élelmiszerrel kezdünk foglalkozni.

7.) A vízzáró csomagolású élelmiszerek (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack stb.) a külső felszín fertőtlenítése után fogyaszthatóak. Tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne szennyeződhessenek csepegő-fröccsenő vízzel, és védve legyenek rovaroktól, állatoktól (pl. egerek stb.) Az élelmiszertároló helyek fertőtlenítése javasolt.

8.) Különös gondot kell fordítani a gyermekek, betegek, idősek megfelelő, kielégítő étkeztetésére és biztonságos élelmiszer ellátására.

9.) Szennyezett ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, vasalás után vehetők használatba.



# AZ ÁNTSZ TERVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETEK KEZELÉSÉRE FÜGGELÉKEK



10.) Elöntött házak lakótereit, alagsori helyiségek, pincék, az ár levonulása után elvégzett takarítás és fertőtlenítés után vehetők újra használatba.

11.) A háztartási hulladékot ár- és belvízmentes szemétkerakó helyre kell szállítani.

12.) Elhullott állatokról az Állategészségügyi szerveket tájékoztatni kell. Az elhullott állatokat az ár- és belvízmentes területen elhelyezett, e célra kijelölt helyekre kell szállítani, és ott, az előírások szerint megsemmisíteni.

13.) Kérjük a lakosságot, hogy lázas vagy hasmenéses megbetegedés esetén azonnal jelentkezzenek az orvosnál.

14.) A személyi higiénés előírások fokozott betartására kell törekedni mindenkinek, aki az ár- és belvízzel sújtott területeken él, vagy a védekezésben vesz részt.





# AZ ÁNTSZ TERVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETEK KEZELÉSÉRE FÜGGELÉKEK



## I. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK

### LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

#### Az árvizek és belvizek esetén alkalmazandó fertőtlenítési eljárásról

1.) Kézfertőtlenítés: szennyezett tárgyakkal, anyaggal történő munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés előtt szükséges, WC használata után.

Fertőtlenítő oldat: 1 percig tartsuk benne! Az oldat 4 óráig használható! (kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban kapható kézfertőtlenítő is használható. (pl. Clarasept) használati utasításuk szerint.)

2.) Szennyezett használati tárgyak fertőtlenítése: (pld. főzőedények, evőeszközök, játékok tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt, hypós oldatban (10 liter vízhez 6 dl hypó) vagy Neomagnolból készített oldatban (literenként 20 tablettá Neomagnol).

3.) Bútorok, egyéb mosható lakberendezési tárgyak fertőtlenítése

A fertőtlenítéshez 10 db Neomagnol tablettát 1 liter vízben oldjunk fel, majd a vízből kiemelt és megszáradt felületeket ezzel az oldattal mossuk át. Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textiliával töröljük át.

4.) Mosható textíliák fertőtlenítése. Egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhető el 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történő áztatással.

5.) Nem mosható textíliák, kárpitos bútorok, szőnyegek fertőtlenítése: 1 liter vízhez 20 tablettá Neomagnolt adva és feloldva az oldattal a fertőtlenítendő textíliát alaposan át kell kényelni! (Vigyázat! A Neomagnol oldat színváltozást okozat!).

6.) Lakóházak, helyiségek fertőtlenítése:

A fertőtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségből visszahúzódott. Ebben az esetben a helyiség padlózatáról – amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a padlózatot, a mosható felületeket (pl. padozat, csempeburkolat, stb.) a fentiek szerint elkészített Neomagnol oldattal kell átmosni és az oldatot hagyjuk rászáradni a felületre. Nem mosható felületeket (pl. meszelt fal) 10%-os klórmész oldattal kell bemeszeln.

10%-os Klórmész oldat készítési módja: 250 gr. Klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatos, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!

Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel, belégyezést, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszín védőkesztyű használatával ill. testfelszín takaró ruházattal védeni kell.



# AZ ÁNTSZ TERVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETEK KEZELÉSÉRE FÜGGELÉKEK



## 7.) Talajfertőtlenítés:

Mezőgazdaságilag művelt területeket klórozni nem szabad, ki kell várni a talaj természetes öntisztulását. A talaj fertőtlenítése (pl. udvar) csak akkor indokolt, ha az észlelhetően fekáliával, egyéb fertőző anyaggal szennyeződött.

Az emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló területek fertőtlenítését klórmészpor összefüggő beszórásával kell elvégezni, amelyet locsolással kell a talajba juttatni.

## 8.) Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy kell végrehajtani, hogy annak felületét klórmésszel összefüggő rétegben beszórjuk, majd vízzel bőségesen leöntözzük. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni.

## 9.) Trágyalé fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy végezzük, hogy  $1\text{m}^3$  trágyaléhez 2 kg klórmészport adunk és ezt az elegyet erre alkalmas eszközökkel alaposan összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk.

## 10.) Vízóraaknák fertőtlenítése:

Kitisztítása után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a falak és a csővezeték, szerelvény 10%-os klórmészoldattal történő meszelése javasolt.

11.) Ürgödörös árnyékszék fertőtlenítése: ülődeszkát, padlózatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10%-os klórmészoldattal be kell meszelni, az ülődeszkát két óras behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni).

12.) Ólak fertőtlenítése: Az előzők szerint 10%-os klórmésszel történjen.

13.) Ásott kutak fertőtlenítését csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni. Ezért forduljanak a helyi önkormányzathoz.

